FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

ENERCAPS

Reforzado con 2 Ginsengs + Multivitaminas y Minerales.

Indicaciones:

Las cápsulas blandas de ENERCAPS están indicadas para personas que sientan cansancio, debilidad corporal o falta de vitalidad.

Suplemento de vitaminas y minerales para las personas con pequeños déficits nutricionales mayor demanda nutricional, especialmente durante el embarazo y la lactancia, convalecencia, debilidad o pérdida de apetito.

ENERCAPS está Indicado como suplemento nutricional de apoyo en circunstancias en las que las vitaminas solubles en agua son requeridas con fines profilácticos o terapéuticos en condiciones de estrés fisiológico. Estos Incluyen:

- Condiciones que causan agotamiento o disminución de la absorción o la biodisponibilidad de las vitaminas esenciales.
- Alimentación Inadecuada debido a dietas muy restringidas o desequilibradas.
- Trastornes gastrointestinales, alcoholismo crónico, infecciones crónicas o agudas (especialmente aquellas que involucran enfermedad febril). Enfermedades prolongadas o degenerativas. Insuficiencia cardiaca congestiva, hipertiroidismo diabetes mal controlada u otros tipos de estrés fisiológico.
- También para los pacientes bajo terapia con anticonceptivos estrogénicos orales o terapia con estrógenos, antibacterianos que afectan a la microflora Intestinal.

Queilosis, estomatitis, gingivitis, y otros síndromes clásicos de deficiencia de vitaminas solubles en agua.

Durante la etapa de recuperación de una cirugía o trauma que implica graves quemaduras, fracturas o cualquier otro daño tisular extenso.

Tratamiento y prevención de deficiencia de folato y anemia megaloblástica.

Composición:

Cada cápsula blanda contiene:

Extracto de ginseng Siberiano..... .....42.5 mg
(Extracto estandarizado de ginseng altamente concentrado correspondiente a Ginseng Siberiano)
Extracto de ginseng Coreano..... .....40 mg
(Extracto estandarizado de ginseng altamente concentrado correspondiente a Ginseng Coreano)
Vitamina A (como palmitato) USP..... .....5000UI

Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) USP…… ……5,0 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) USP……3,0 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) BP…….. 1.0 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) BP..... ..... ……2.0 mg
Vitamina C (ácido ascórbico) BP..... 40.0 mg
Vitamina D3 (colecalciferol) USP……500 UI
Vitamina E (di-alfa tocoferol acetato) USP..... ……10,0 mg
Niacinamida BP……..20 mg
Calcio D Pantotenato USP.....5,0 mg
Ácido fólico BP……0,5 mg
Hierro(como fumarato ferroso) USP ……15.0 mg
Cobre(como sulfato de cobre) BP……0,5 mg
Potasio (como sulfato de potasio) BP.....2.0 mg
Manganeso (como monohidrato de sulfato de manganeso) USP……0.5 mg
Magnesio (como sulfato de magnesio heptahidratado) USP……..3.0 mg
Zinc (como óxido de zinc) USP.....0.5 mg
Calcio (como calcio dibásico) USP……75 mg
Fósforo (como anhidrato de fósforo) USP……58 mg
Yodo (como yodato de potasio) BP……0.1 mg
Excipientes……c.s

Vía de Administración:
Administración Oral.

Acción terapéutica:
Suplemento vitamínico con acción antioxidante y energizante.

Duración del tratamiento:
Según recomendación médica.

Uso durante el embarazo la lactancia:
Se han reportada reacciones teratogénicas con vitaminas específicas (especialmente las solubles en grasa) y minerales, pero por lo general a niveles sustancialmente más altos que los de las cápsulas de ENERCAPS.
Se deben evitar dosis excesivas de vitamina A durante el embarazo debido a posibles efectos teratogénicos.

Modo de empleo:
Ingerir la dosis recomendada con suficiente agua.

Dosis y duración del tratamiento:
Ingerir 1 capsula blanda al día o según recomendación médica.

Precauciones y Advertencias:
Su segundad en niños menores de 12 años no ha sido establecida. Evaluar el riesgo-beneficio en pacientes diabéticos dada una posible alteración en necesidad de insulina o hipoglicemiantes orales.
Los pacientes que ingieren grandes dosis, con insuficiencia renal o deshidratación y desequilibrio electrolítico, podrían estar predispuestos a sufrir el síndrome de Burnett, que incluye hipercalcemia y alcalosis, junto con disfunción renal.
Las dosis elevadas o el uso prolongado pueden dar lugar a la hipersecreción gástrica y el rebote ácido.

Reacciones adversas:
Nauseas, diarreas, dolor abdominal, fatiga, debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, erupción (enrojecimiento y picazón de la piel) cuando es en altas dosis.

Interacciones:
La mayoría de las interacciones indican que muchos fármacos interfieren con la absorción de vitaminas, mediante la estimulación de su metabolismo, o bien aumentando la tasa de su excreción. Por ejemplo, el clofibrato disminuye la absorción de vitamina B12.
La parafina líquida interfiere con la absorción de vitaminas A, D, E y K. Difenilhidantoina estimula el metabolismo del ácido fólico, de la vitamina D y de la vitamina K.

Sobredosis:
En casos de sobredosificación solicite atención médica de urgencia. Los síntomas de sobredosificación pueden incluir náuseas y vómitos.

Contraindicaciones:
Alergia o hipersensibilidad a algún componente del medicamento, alta concentración en sangre de vitamina A, alcoholismo crónico, cirrosis, enfermedad crónica de hígado o riñon.

Presentación:
Caja x 30 capsulas blandas.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar a una temperatura menor a los 25 °C y protegido de la luz.

Recomendaciones:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Consultar al médico si no advierte mejoría.