IVERMECTINA

Ivermectina USP 6 mg

Composición:
Cada comprimido contiene:
Ivermectina USP .....6 mg
Excipientes.....c.s.
Contiene manitol.

Acción terapéutica: Antiparasitario de amplio espectro.

Indicaciones
Este medicamento está indicado para el tratamiento de enfermedades parasitarias: oncocercosis, estrongiloidiasis, escabiosis (sarna) humana.

Vía de administración
Administración oral.

Forma farmacéutica
Comprimidos.

Duración del tratamiento
De acuerdo a criterio médico.

Uso durante el embarazo y lactancia
No administrar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Dosis
La dosis recomendada es de 6mg como dosis única. Una dosis única de 200mcg/kg. Repetir la dosis luego de una semana. Evaluación clínica de presencia de huevos, o parasitosis en heces.
Para oncocercosis: 200mcg/kg/día, durante el tiempo que determine una evaluación médica.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo y lactancia.

Precauciones y advertencias
En los pacientes con microfilariosis, pueden presentarse reacciones cutáneas, oftalmológicas o sistémicas debido a la reacción alérgica que ocurre tras la muerte de las microfilarias (reacción de Mazzotti), estos fenómenos pueden confundirse o agregarse a reacciones de hipersensibilidad hacia el fármaco, por lo que no deben perderse de vista estos eventos, para tomar las medidas de sostén pertinentes; la seguridad y eficacia en niños menores de 15 kg de peso no ha sido establecida.

Reacciones adversas
Astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, náusea y vómito; somnolencia, vértigo y urticaria.

Interacciones medicamentosas
Se ha observado elevación de ALAT y ASAT en 2% de los pacientes tratados, sin que se haya demostrado una relación con el medicamento.
En 3% de los casos, se observó leucopenia y en un solo paciente se ha reportado anemia reversible.

Sobredosis
Los síntomas de una sobredosis de este medicamento pueden incluir: erupción cutánea o picazón, hinchazón, dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, dificultad para respirar, hormigueo, incapacidad para controlar los movimientos del cuerpo y convulsiones.
Si sus síntomas son severos informe inmediatamente a su médico.

Presentación
IVERMECTINA USP 6 mg caja por 4 comprimidos.

Condiciones de almacenamiento
Almacenar a una temperatura inferior a los 30°C en un lugar seco y protegido de la luz.

Recomendaciones
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte a su médico si no advierte mejoría.